

## Форма №13

### *Рекомендации после проведенного удаления.*

- \* 2 часа не есть, не пить
- \* через 20 минут удалить марлевый тампон
- \* исключить все полоскания
- \* тщательная гигиена полости рта, щадящая в области удаленного зуба (мягкая зубная щетка)
- \* исключить травмирование области удаленного зуба руками, языком, инородными предметами
- \* исключить употребление алкоголя, ограничить физические нагрузки, посещение парной, сауны, бани (в течение 2-3 дней)

***Что может быть (бывает), и это нормально, поэтому не нужно беспокоиться, пройдет в течение 5 суток:***

- \* Болевые ощущения в области операции до 3-х дней (можно принять обезболивающие средства).
- \* Скудное кровотечение в течение 1 дня
- \* Отечность, припухлость тканей, нарастает до 3-х суток, затем идет на убыль (нужно прикладывать холод на протяжении 2-х часов после удаления по схеме: 10 минут — холод, 10 минут — отдых)
- \* Повышение температуры тела до 38 ° в течение 3 дней (при повышении температуры до 38 ° жаропонижающее не принимать!).
- \* Небольшая гематома - «синяк».
- \* Слегка затрудненное открывание рта.
- \* Онемение, покалывание, ощущение зуда в месте вкола анестезии.

***Чего не должно быть и что потребует участия врача и поэтому не надо терпеть:***

- \* Обильное кровотечение, не останавливающееся в течении 2-х часов, либо скудное, продолжающееся более суток.
- \* Аллергическая реакция (сыпь, зуд)
- \* Постоянная, ноющая, сильная боль, не снимающаяся анальгетиками
- \* Неприятный запах изо рта
- \* Повышение температуры выше 38 °
- \* Стойкое онемение, ощущение не проходящей анестезии в течение 2-3 дней

**При появлении каких-либо жалоб, обратиться в клинику по номеру  $\{\text{ourcompany:phone}\}$**

***На какие виды деятельности пациента может негативно повлиять операция в течение нескольких часов (в крайне редких случаях):***

- \* Активная умственная деятельность (возможны замедленные реакции)
- \* Активная речевая деятельность (возможны затруднения в произношении слов, ухудшение дикции).
- \* Вождение автомобиля.

**Рекомендовано принимать Амоксиклав 1000мг по 1 таблетке 2 раза в день, в теч. 5ти дней.  
Для профилактики развития воспалительных осложнений.**